



Revidert 28.08.18 (endring knyttet til tekst ikke resultater)

Resultater fra avlingsundersøkelser i løk 2018

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) (styringsgruppa i løk) foretok avlingsundersøkelser i løk 8. – 10. august 2018. Undersøkelsene ble foretatt i Østfold, Vestfold, Oppland, Hedmark og Nord-Trøndelag (Frosta).

Gul løk

Resultatene fra årets avlingsundersøkelser er preget av den varme og tørre sommeren.

Det er stor variasjon fra felt til felt både med hensyn avling og til løkstørrelse.

Tidlig satt løk har klart seg best da denne var kommet lengst i utvikling før det ble for varmt.

Mange arealer som ligger sør- og vestvendt har fått varmeskader, med liten løk og lav avling som resultat.

Den tørre og varme forsommer førte også til ujevn spiring i mange felter.

I Rogaland og Trøndelag har temperaturene vært noe lavere enn på Østlandet. Dette har ført til mindre varmestresset løk og med det mer normale avlinger i de to områdene (GPS har sett på felter i Rogaland, men ikke tatt ut prøver der).

Samlet sett, for hele Norge, forventer vi at avlingene av gul løk i 2018 blir ca. 70% av 2017 - avlingen. Andelen løk under 65 mm anslås til være ca. 20 % høyere enn i 2017.

Kvaliteten på løken var bra da prøvene ble tatt ut, selv om det registreres noe Fusarium og bakterieråte i nesten alle områdene som ble besøkt. Forutsatt at vi ikke får spesielt dårlige forhold under innhøstingen ser det svært lovende ut med tanke på kvaliteten på den norske gule løken.

GPS mener prognosen tilsier at norsk gul løk, høstet i 2018, kan forventes å være i markedet til i slutten av mars 2019.

Rødløk

Avlingsundersøkelsen tilsier at rødløken har taklet varmen og tørken bedre enn den gule løken. Kvaliteten på løken var bra da prøvene ble tatt ut, selv om det registreres noe bakterieråte i alle områdene som ble besøkt.

Samlet sett, for hele Norge, forventer vi at avlingene av rød løk blir ca. 80% av 2017-avlingen. Andelen løk under 65 mm anslås til være ca. 20 % høyere enn i 2017.

Forutsatt at vi ikke får spesielt dårlige forhold under innhøstingen ser det svært lovende ut med tanke på kvaliteten på den norske rødløken.

GPS mener prognosen tilsier at norsk rød løk, høstet i 2018, kan forventes å være i markedet til i slutten av april 2019.

Noen detaljer fra avlingsundersøkelsen i løk:

8. august

Østfold:

Gul:

Ca. 30 % lavere avling enn i 2017 ved prøveuttak.
Det er stor variasjon fra felt til felt i avling og størrelse.
Tidlig satt løk er best.

Rød:

Ca. 20% lavere avling enn i 2018 ved prøveuttak.
Det er stor variasjon fra felt til felt i avling og størrelse

Vestfold:

Gul:

Ca. 20 % lavere avling enn i 2017 ved prøveuttak.
Det er stor variasjon fra felt til felt i avling og størrelse.
Tidlig satt løk er best. I enkelte av de tidlig satte feltene var det en viss andel av løk over 90 mm da prøven ble tatt ut.

Rød:

Ca. 20 % mindre avling enn i 2017 ved prøveuttak.

9. august

Oppland

Gul:

Ca. 30 % mindre avling enn i 2017 ved prøveuttak.
Stor variasjon fra felt til felt.

Rød:

Ca. 10% mindre avling som i 2017

Hedmark

Gul:

Ca. 30 % lavere avling enn i 2017 ved prøveuttak.
Stor variasjon fra felt til felt.

Rød:

Ca. 25 % lavere avling enn i 2017 ved prøveuttak.
Stor variasjon fra felt til felt.

10. august:

Nord-Trøndelag (Frosta)

Gul:

Litt under 30 % lavere avling enn i 2017 ved prøveuttak.

Dette tilsier trolig det vi kan kalle en normalavling på grunn av at det var svært gode avlinger i 2017.

Rød:

Tilnærmet samme avling som ved prøveuttak i 2017

Vi forventer likevel en avlingsreduksjon på ca. 10% avling i forhold til 2017 pga. noen dårlige åkrer der det er brukt importert setteløk.

En rekke produsenter, rådgivere, stikkløkleverandører m.fl. deltok på avlingsundersøkelsen i løk 2018.

Arvid Laksesvela og Morten N. Andersen deltok fra GPS- administrasjonen.

Oppsummeringen ble 14.08.18 gjennomgått og godkjent av styringsgruppa for løk.

28.08.18

GPS v/Arvid Laksesvela og Morten N. Andersen