

Prognose for gulrotmengder 2019/2020

Avlingsundersøkelser i gulrot 2019

GPS v/styringsgruppa for gulrot har også i år foretatt avlingsundersøkelser i de største gulrot-distriktene. Undersøkelsene ble foretatt i perioden 9. – 20. september 2019. Det ble tatt ut avlingsprøver i 62 gulrotåkrer. Samlet sett viser avlingsundersøkelsene ca. 13 % høyere avling i år **enn i 2017**, hele landet sett under ett og vektet etter arealet i de ulike distriktene. **Vi sammenligner årets gulrotavling opp mot 2017 sesongen.** 2018 sesongen var ekstraordinær, mens **2017** mer kan betegnes som en normalsesong mht. avling. Prognosen til GPS i **2017** indikerte markedsdekning til ca. 1. juni i 2018, men på grunn av stort lagersvinn hadde vi i praksis ikke markedsdekning lenger enn til i slutten av april 2018.

Status og prognose for lagringsgulrota pr. 20.09.19:

Alle gulrotfeltene det ble tatt avlingsprøve fra hadde friskt gras og velformet gulrot. Det var gjennomgående gunstige forhold under spiring i alle distrikter. Det har stort sett ført jevn fin størrelse på rota i alle felter og distrikter. Da vi tok ut avlingsprøver var det god vekst i gulrota. Høyt plantetall (på grunn av jevn og god spiring) gjør at det er liten fare for at gulrota blir for stor selv om opptaket skulle bli noe forsinket.

Kvalitet på gulrøttene landet sett under ett, både med hensyn til form og lengde, ser ut til å bli meget bra i år.

Konklusjon:

Været kan spille oss et puss med tanke på opptak og evt. drukning. Lagersvinnet vet vi selvsagt heller ingenting om nå. Alt tilsier imidlertid at avlingen i år passer ganske godt mht. at vi, med «normale» opptaksforhold og «normalt» lagersvinn, skal kunne ha tilnærmet norsk markedsdekning fram til ny norsk sesong starter i juni 2020.

NB:

- Dette er en avlingsundersøkelse som er foretatt før opptak av lagringsrota.
- Landbruksdirektoratet gjennomfører offisiell lagertelling pr. 1. november.

Detaljer fra avlingsundersøkelsene i 2019 i forhold til tilsvarende undersøkelser i 2017:

- Telemark ser ut til å få avling som ligger ca. 3 % over 2017
- Vestfold ser ut til å få avling som er identisk med 2017
- Østfold (inkl. Frogn i Akershus) ser ut til å få avling som ligger ca. 6 % under 2017
- Oppland og Akershus ser ut til å få avling som ligger ca. 26 % over 2017
- Hamar-området ser ut til å få avling som er identiske med 2017

- Solør ser ut til å få avling som ligger ca. 30 % over 2017
- Rogaland ser ut til å få avling som ligger ca. 18 % over 2017
- Smøla ser ut til å få avling som ligger ca. 7 % over 2017
- Ørlandet og Overhalla ser ut til å få avling som ligger ca. 6 % over 2017
- Verdal/Levanger ser ut til å få avling som ligger ca. 11% over 2017
- Frosta ser ut til å få avling som ligger ca. 20 % over 2017

NB: I prognosen til GPS er arealene for de ulike distriktene vektet opp mot totalavling.

23.09.2019

For gulrot-styringsgruppa i GPS

Arvid Laksesvela (sign.)

Morten N. Andersen (sign.)